

Comunicato Tecnico Nocciolo 04/04/2018

Patologie da controllare ad inizio vegetazione:

- **Eriofide:** alla rottura delle gemme parassitate che in genere coincide con l'emissione della terza foglia, (prima foglia diametro 3/5 cm) intervenire con zolfo bagnabile in formulazioni particolarmente adesive;



Gemma parassitata ancora chiusa


Rottura della gemma Eriofidi in migrazione alla ricerca ed inizio migrazione

dii nuove gemme da parassitare

- **Batteriosi:** negli ultimi anni si sono notati importanti danni da necrosi batterica che può provocare la caduta dei frutticini, intervenire con prodotti rameici in particolari formulazioni;



- **Cocciniglie:** alcuni noccioleti sono particolarmente infestati, (sicuramente hanno influito i trattamenti insetticidi di inizio stagione negli anni precedenti), in tal caso intervenire con oli estivi sulle neanidi.



- **Nutrizione:** l'andamento climatico può influire negativamente sullo sviluppo dei frutticini. E' importante apportare aminoacidi e microelementi specifici per aiutare la pianta nel momento di stress;



Trattamento consigliato:

Thiopron 5-10lt./ha oppure Zolvis 5kg/ha + Z400 5lt./ha;

Dentamet 2 lt/ha oppure 1R45 3lt./ha

Combinut 2 kg/ha

Si può alternare l' intervento con zolfo ramato polverulento;

Se l'infestazione di eriofide supera la soglia (10 % gemme gallate) ripetere il trattamento dopo 10/15 giorni;



Daremo tempestive comunicazioni sull' evolversi della cimice asiatica

Seguici sui siti: www.emporiotraversa.com – www.traversalorenzo.com

e mail: info@traversalorenzo.com